

1-Vir acompanhado (não pode conduzir no final do exame)

2- Trazer eletrocardiograma e análises ao sangue que tenha em casa.

3- Trazer medicamentos que esteja a tomar e se estiver a tomar anticoagulantes, fale com o seu médico de família para poder fazer o exame.

4- Trazer credencial do médico de família (P1).

Nome: _____

Colonoscopia marcada para: ____/____/____, às _____ horas

Nos **2 dias antes do exame** deverá fazer a seguinte dieta:

Pequeno-almoço e lanches:

- Chá com açúcar ou sumos claros sem polpa (ex: ice tea, sumo de maçã...)
- Bolachas / biscoitos secos (bolachas tipo maria, água e sal) - Pão branco (nunca integral) com manteiga

Almoço e jantar:

- Sopa branca (com batata, arroz ou massa)
- Carnes / peixes magros cozidas ou grelhadas (vitela, galinha, coelho, pescada, marmota, robalo...)
- Arroz, puré de batata, massa, batatas cozidas ou ovo cozido- Fruta sem sementes e sem casca (ex: maçã, pêra, ...)

Não ingerir legumes, leguminosas, cereais, frutos vermelhos, nem frutas com sementes (ex: maracujá, uva, kiwi...).

Adquirir na farmácia **PLENVU®**

NOTA: Se é obstipado “o intestino funciona mal”, sugerimos a toma de 2 comprimidos de Dulcolax à noite, nos 3 dias antes do exame.

Dia anterior ao exame:

Poderá tomar o pequeno-almoço e almoçar, cumprindo as recomendações da dieta. Após o almoço, deve apenas beber chá, sumos transparentes sem gás e sem polpa, e gelatina de cor clara (ex: ananás).

Às 21h do dia anterior ao exame:



Tomar **1 saqueta Dose 1** dissolvida em 500ml de água e beber em 30 - 45 min. De seguida ingerir 500ml a 1000ml de líquidos claros.

Às 5 h do dia do exame:



Misturar **saquetas A e B da Dose 2** dissolvidas em 750ml de água e beber lentamente em 45 min. De seguida ingerir 500ml a 1000ml de líquidos claros.

NOTA: É de extrema importância que tome a quantidade de líquidos indicado e às horas indicadas, pois o sucesso do exame é determinado em grande parte pela preparação intestinal. O jejum 2h antes do exame inclui não beber água nem outros líquidos.

ATENÇÃO: O jejum 2h antes do exame inclui não beber água nem outros líquidos.